Lieux d'application des auxiliaires

Mesures d'accompagnement

Les mesures ci-dessous peuvent s'avérer judicieuses :

	Lors d'une application de mouches à purin	Lors d'une application d'hyménoptères
Bandes collantes	oui	oui
Appâts granulés	non	oui
Larvicides	non	oui
Insecticides application locale contre les mouches adultes selon le mode d'emploi	oui	oui

UFA NÜTZLINGE AUXILIAIRES
SAMEN | SEMENCES

fenaco | **Semences UFA Auxiliaires** | Nordring 2 | 4147 Aesch
téléphone 058 434 32 82 | nuetzlinge@fenaco.com | www.nuetzlinge.ch

Expéditeur :

Nom, prénom: _____

Rue: _____

NPA, lieu: _____

Téléphone: _____

Je désire recevoir la facture par la LANDI de _____

Date, signature: _____

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

fenaco Genossenschaft
UFA-Samen Nützlinge
Nordring 2
4147 Aesch

UFA NÜTZLINGE AUXILIAIRES
SAMEN | SEMENCES

Lutte contre la mouche d'étable avec des auxiliaires

Les mouches d'étable causent des perturbations et transportent des germes dans les étables. Les auxiliaires anéantissent les mouches dans différents systèmes de stabulation.

La mouche d'étable


Cycle de vie mouche d'étable
Mouche
Œufs
Endroits humides dans les canaux à purin (croûte flottante) et les couches profondes
Nymphes
Endroits secs dans les canaux à purin et les couches profondes
Larves
Endroits humides dans les canaux à purin (croûte flottante) et les couches profondes

Notre concept

1. Eviter l'apparition des mouches par l'hygiène : nettoyer minutieusement les écuries au printemps. Eliminer systématiquement les lieux de reproduction comme les restes de lait, fumier ou fourrages, particulièrement dans les recoins non nettoyés.
2. Lâcher les auxiliaires dès l'apparition des premières mouches.
3. Si la population de mouches est déjà abondante dans l'écurie, appliquer d'abord un larvicide, p. ex. Neporex dans la paille ou le canal à purin, et pulvériser localement un insecticide contre les adultes selon le mode d'emploi. Attendre environ 10 jours puis commencer avec les lâchers d'auxiliaires.

Conseils pour les auxiliaires

Pour l'application de l'auxiliaire approprié et le choix de l'intervalle de temps adéquat entre les lâchers, nous vous suggérons un entretien personnalisé : Tél. 058 434 32 93 ou envoyez-nous la carte de commande avec vos coordonnées et nous vous contacterons.

Fumier liquide : mouche à purin

Lieux d'application : canaux à purin avec croûte flottante (caillebotis) dans les écuries et les porcheries.

Mode de vie : la mouche à purin ressemble à la mouche d'étable mais elle craint la lumière et vit de ce fait uniquement dans les canaux à purin. Elle ne dérange ni les humains ni les animaux. La larve de la mouche à purin se nourrit de la larve de la mouche d'étable.

Application : vous recevez automatiquement par poste 12 livraisons à intervalles de 2 semaines (ou selon entente).
Porcheries : suspendre le paquet ouvert à proximité des caillebotis selon le mode d'emploi. 1 emballage pour 100 m² de surface au sol.
Ecuries : répartir régulièrement le contenu du paquet sur la croûte flottante de purin dans le canal selon le mode d'emploi. 1 emballage pour 20 m de canal.

Fumier solide : hyménoptères parasitoïdes

Lieux d'application : couche profonde dans les écuries (surtout les veaux), les porcheries et les poulaillers.

Mode de vie : l'hyménoptère parasitoïde mesure 2 mm et n'est presque pas visible à l'œil nu. Il ne dérange ni les humains ni les animaux. Il pond ses œufs dans les nymphes de mouches d'étable. De ces nymphes parasitées éclosent de nouveaux hyménoptères.

Application : répartir le contenu du paquet dans la paille de la couche profonde selon le mode d'emploi. Vous recevez automatiquement par poste 12 livraisons à intervalles de 2 semaines.

Moment d'application

Application toute l'année dans les porcheries avec une température dès 18 °C. La période optimale d'application se situe 1 semaine après la vidange du canal ou juste après le renouvellement de la couche profonde lorsque la population de mouches est encore faible. Rythme d'enlèvement du fumier solide de 4 semaines au minimum.

Un bon effet est obtenu avec 12 livraisons régulières d'avril à octobre.

NÜTZLINGE AUXILIAIRES
UFA SAMEN / SEMENCES

Carte de commande abonnement auxiliaires

(Commande par internet : **www.auxiliaires.ch**)

☐ Veuillez svp me contacter pour un conseil personnalisé. Mon numéro de téléphone : _____
(cocher si souhaité)

Auxiliaire	Prix en CHF par 100 m²	Je commande : (indiquer le nombre d'unités)
Mouche à purin pour 100 m² (prix global pour 12 livraisons)	290.—	
Envoi individuel supplémentaire	27.—	
Mouche à purin dès 300 m² (prix global pour 12 livraisons)	232.—	
Mouche à purin dès 1000 m² (prix global pour 12 livraisons)	174.—	
Hyménoptère parasitoïde pour 100 m² (prix global pour 12 livraisons)	290.—	
Envoi individuel supplémentaire	27.—	
Hyménoptère parasitoïde dès 300 m² (prix global pour 12 livraisons)	232.—	
Hyménoptère parasitoïde dès 1000 m² (prix global pour 12 livraisons)	174.—	

Remarques :
- Vous recevrez la première livraison par poste env. 1 semaine après la commande.
- Frais de port non inclus.
- Attention : ne pas oublier de mentionner les adresses au verso de la carte de commande !

Consultez notre site internet : **www.auxiliaires.ch**